

Aus der Chirurgischen Abteilung der Universitäts-
Kinderklinik in München (Leitung: Prof. Dr. R. Drachter).

Ein Beitrag zur Hydronephrose.

Inaugural - Dissertation.

Der Medizinischen Fakultät
an der Albert-Ludwigs-Universität
zu Freiburg im Breisgau
vorgelegt von

Hans Heinrich Krause.

Dekan: Prof. Dr. Kapfhammer
Referent: Doz. Dr. von Pannewitz

1933.

Lebenslauf.

Am 3. Juli 1906 wurde ich in Naumburg a. d. S. geboren. Mein Vater ist der Prof. Dr. F. E. A. Krause in Heidelberg, meine Mutter Frau Elfa Krause in Naumburg. Meine Schulzeit verbrachte ich in den Jahren 1913 bis 1922 teils in Swinemünde, teils in Naumburg und Heidelberg. Von 1922 bis 1925 widmete ich mich zunächst einer kaufmännischen Ausbildung in Naumburg, danach besuchte ich noch die Oberrealschule in Weissenfels, an der ich 1928 die Reifeprüfung bestand.

Mein medizinisches Studium begann ich als Sanitätsoffizieranwärter des Reichsheeres im Sommer 1928 in Marburg, studierte dann weiter in Königsberg, wo ich die Vorprüfung ablegte, und in München. 1932 schied ich auf eigene Veranlassung wieder aus dem Reichsheer aus, um mich nur mehr der freien ärztlichen Tätigkeit künftighin widmen zu können. Die letzten Semester studierte ich dann an den Universitäten in Basel und Freiburg und legte 1933 in Freiburg das medizinische Staatsexamen ab.

Hans Heinrich Krause.



Die Frage der Hydronephrosen interessiert uns heute insbesondere bei den Fällen, wo es noch unerklärt ist, wie sich ein solcher pathologischer Zustand der Niere herausbilden kann. Wenn auch in vielen Fällen ein Zusammenhang der Nierenerkrankung mit einer Veränderung an einer Stelle des Urogenitalsystems besteht, der im Sinne einer Abflußbehinderung und Harnretention oberhalb dieser Stelle die Entwicklung einer Hydronephrose bedingt, so treffen wir doch immer wieder solche Fälle an, deren Entstehung ganz im unklaren liegt. Nach *Israel* (1) gehören sogar die Mehrzahl der zur Operation kommenden Fälle dazu.

Die beiden vorliegenden Fälle wurden in der Chirurgischen Abteilung der Münchener Universitäts-Kinderklinik (Leitung der Abteilung: *Prof. Dr. Drachter*) operiert.

1. Fall: Neunjähriges Mädchen.

Traumatische Ruptur der rechten hydronephrotischen Niere.

Aus der Anamnese: Das Kind hatte im dritten Lebensjahr Masern und Keuchhusten, im siebenten Diphtherie durchgemacht. (Es wurden nie Erscheinungen von seiten des Urogenitalsystems bemerkt.)

Am 26. Oktober 1931, mittags, wollte das Kind eine auf ebenem Boden stehende Bratraine überspringen, es sprang dabei fehl und fiel mit der rechten Seite auf die Kante des Geschirres. Einen Moment wurde dem Kinde schwarz vor den Augen und es verspürte sofort einen heftigen Schmerz in der rechten Bauchseite. Es mußte sich einige Minuten hinsetzen und erbrach dabei. Im Erbrochenen fand sich kein Blut. Das Kind konnte alleine nach Hause gehen und verlangte sofort ins Bett. Bald darauf wurde es bewußtlos und erwachte erst nach mehreren Stunden wieder. Der Arzt kam um 6 Uhr abends und veranlaßte die Einlieferung in die Klinik wegen intraabdomineller Blutung. Es bestanden noch unverändert starke Schmerzen, der Urin, den das Kind einmal lassen mußte, sah aus wie reines Blut. Schmerzen bestanden beim Wasserlassen nicht. Das immer blasser werdende Kind wird noch am Abend in die Klinik eingewiesen.

Befund am 26. Oktober, abends 10 Uhr:

Altersgemäß gut entwickeltes, neunjähriges Mädchen in mäßigem Ernährungszustande. Das Kind macht einen aus-

gesprochen schwerkranken Eindruck, marmorblaßes Gesicht, verfallene Züge, schweißbedeckte Stirn, völlig klares Bewußtsein. Die Zunge ist mäßig feucht und belegt, die Atmung angestrengt und oberflächlich, der Puls ist sehr frequent (170 in der Minute) und leicht unterdrückbar. Der Leib erscheint etwas aufgetrieben, der Nabel ist eingezogen. Keine Veränderungen an der Haut. Im Bereich der rechten seitlichen Lendengegend wird heftiger Schmerz angegeben. Derselbe wird bei Betastung der rechten Nierengegend gesteigert und führt zu Bauchdeckenspannung. Bei der genauen äußeren Betrachtung dieser Gegend fällt eine leichte, diffuse Vorwölbung von der letzten Rippe bis zum Darmbeinkamm auf. Diese entspricht einer Dämpfungszone, die nach vorne im Bereich einer vom Rippenbogen in der Axillarlinie nach der Spina iliaca ant. sup. verlaufenden Linie sich verliert. Eine tiefere Palpation dieser Gegend verhindern die reflektorische Spannung der Bauchdecken und Schmerzhaftigkeit. Die Leberdämpfung findet sich an normaler Stelle. Die Perkussion des übrigen weichen, gut eindrückbaren, druckschmerzfreien Abdomens, das keine abnorme Resistenz bietet, ergibt hellen, tympanitischen Schall.

Während der Untersuchung erbricht das Kind. — Da es nicht spontan zu urinieren vermag, wird katheterisiert und dabei eine Tasse voll fast reinen Blutes entleert.

Diagnose: Nierenruptur rechts.

Da keine Zeichen einer Mitverletzung noch anderer Bauchorgane bestanden und keine unmittelbare Verblutungsgefahr, wurde vorerst abwartend behandelt: Flache Lage, Tieflagerung des Kopfes, Eisblase auf die rechte Lendengegend und 10 ccm Clauden intramuskulär injiziert.

Am 27. Oktober, morgens: Temperatur 38,1°, abends: 38,6°; Puls 120 bzw. 150, mittelkräftig und regelmäßig. Die verfllossene Nacht war ziemlich unruhig — zweimal Erbrechen —, das Allgemeinbefinden ist relativ zufriedenstellend. Die Spontanschmerzen sind erheblich zurückgegangen, Abdominalbefund unverändert, Urin wird spontan und schmerzlos entleert, dunkelrot, 400 ccm.

Es wurde nun die Urographie mittels 20 ccm Urofektan B, intravenös, vorgenommen (das Urofektan wird anstandslos vertragen). Die Röntgenaufnahme ergibt linksseitig normale Verhältnisse. Auf der rechten Seite läßt sie in der normalen Ausscheidungszeit im großen und ganzen nur einen zweimarkstückgroßen, rundlichen, ziemlich scharf begrenzten Urofektanschatten erkennen, der sich etwa ein Querfingerbreit neben dem Querfortsatz des vierten Lendenwirbels befindet; es dürfte sich

um in das retroperitoneale Gewebe ausgetretene Kontrastflüssigkeit handeln. Andere, das Vorhandensein der rechten Niere sichernde Anhaltspunkte sind nicht deutlich zu erkennen.

Am 28. Oktober, morgens: Temperatur 38,5°; Puls 180, ziemlich gut gefüllt. Das Allgemeinbefinden ist etwas verschlechtert — kein Erbrechen. Die Schmerzhaftigkeit und Spannung der Bauchdecken im Bereich der rechten Lendengegend nehmen zu. Aus diesem Grunde, und wegen der anhaltenden Entleerung fast reinen blutigen Urins (nach und nach etwa 1 Liter), wird am Morgen noch, also am dritten Tage nach der Verletzung, auf die rechte Niere operativ eingegangen.

Operation in Avertin — Rektalnarkose durch *Professor Dr. Drachter*.

Lumbalschnitt — nach Durchtrennung der Bauchdecken stellt sich ein großer, bläulichroter, fluktuierender Tumor in der Wunde ein. Beim Abtasten des mit blutiger Flüssigkeit bedeckten, tiefsitzenden unteren Poles der enorm vergrößerten Niere fühlt man einen weitklaffenden Riß. Der etwa doppelfaustgroße, allem Anschein nach vollkommen hydronephrotische Sack läßt sich von der Umgebung ohne besondere Schwierigkeiten abschieben. Nach Vorziehung der Sackniere vor die Wunde sieht man, daß Ureter und Gefäße normal verlaufen und intakt sind. Extirpation des Sackes nach Abklemmung des Nierenstiels, Unterbindung des Ureters und der Gefäße mittels Seide — Zigarettdrainage der Wundhöhle und Vereinigung der Wundränder durch Schichtnaht.

Nach der Operation ist der Puls schwach und sehr beschleunigt. Nach Kardiazolinjektion rasche Besserung.

Beschreibung der extirpierten Niere: Der in Toto ausgeschälte Hydronephrosensack, aus dem während der Operation etwa 1/2 Liter flüssigen Blutes entleert wurde, hat einen sehr derben Balg, dessen Dicke im allgemeinen etwa 2 mm beträgt; an mehreren Stellen ist derselbe durchscheinend. Am unteren Pol findet sich ein annähernd querverlaufender, weitklaffender, etwa 6 cm langer, zackiger Riß. Während die Außenwand vollständig glatt erscheint, zeigt die Innenwand ein ausgedehntes System von breiteren und schmälere, im ganzen nur wenig ins Lumen vorragender Verdickungen. Von Nierensubstanz ist so gut wie nichts mehr nachzuweisen. In der Mitte des gänsefüßig ausgedehnten Nierenbeckens geht der Ureter ab; derselbe zeigt keine Besonderheiten. Nach Ausfüllung des Sacks mit Gelatine ergeben sich folgende Maße:

Größte Länge 16 cm,

Größte Breite 12 cm,

Größter Umfang 24 cm,
Kleinsten Umfang 11 cm.

Am 29. Oktober Abendtemperatur 37,8°; Puls 100, ziemlich kräftig. Das Allgemeinbefinden ist relativ gut. Es erfolgt spontane Entleerung nur noch wenig bluthaltigen Harnes. Kein Erbrechen mehr, das Abdomen ist nicht aufgetrieben und nicht druckempfindlich. Am 30. Oktober besteht noch leichte Temperaturerhöhung und starke Sekretion blutig urinöser Flüssigkeit aus der Wundhöhle. Der Urin ist frei von Blut. In den darauffolgenden Tagen bessert sich rasch das subjektive Wohlbefinden, Temperatur geht zur Norm zurück, Urin und Stuhl sind geregelt, die Wunde per primam geheilt. Am 12. November konnte das Kind vollständig geheilt aus der Klinik entlassen werden.

*

2. Fall: Dreijähriger Bube.

Linksseitige Hydronephrose.

Das Kind erkrankte im November 1931 an Malaria; danach erholte es sich nicht mehr, blieb sehr schwach, müde und unlustig. Von dem behandelnden Arzt wurde in dem auffallend „scharfen“ Urin Albumen festgestellt und deshalb Bettruhe, Wärme und Nierendiät verordnet. Am 30. Dezember, mittags, mußte das Kind plötzlich zweimal erbrechen und bekam krampfartige, kolikähnliche Schmerzen; der Stuhl war immer normal. Der Arzt wies das Kind wegen Cystitis in die Klinik ein.

Das Kind kam zunächst auf die innere Abteilung der Klinik. Aus dem Befund und der Krankengeschichte ist folgendes hervorzuheben:

30. Dezember 1931: Das Abdomen ist gut eindrückbar, links in der Milz-Nierengegend ist ein weicher größerer Tumor zu fühlen. Der Tumor ist nicht scharf abgegrenzt, da aber die Palpation Schmerzen verursacht, kann der Tumor nicht abgegrenzt werden. In Bauchlage läßt sich eine leichte Schwellung der linken Nierengegend feststellen. Die Milz ist von dem Tumor nicht abzugrenzen. Der Urin ist makroskopisch trübe, er enthält reichlich Leukozyten und Schleim.

Am 31. Dezember läßt sich der Tumor nicht mehr palpieren, die Druckempfindlichkeit in der linken Nierengegend ist aber noch sehr stark. Am 1. Januar 1932 verschlechtert sich der Zustand des Kindes, es klagt spontan über Leibscherzen. Das Abdomen ist gespannt und besonders im Bereich der linken Niere stark druckempfindlich. Der am 30. Dezember festgestellte Tumor ist deutlich zu fühlen.

Da bisher die Därme stark lufthaltig waren, konnte noch keine Urofektanaufnahme gemacht werden. Diese wird erst am 2. Januar vorgenommen. Die Injektion (6 ccm) wurde gut vertragen. In Beckenhochlagerung wurden zwei Aufnahmen gemacht. Die erste Aufnahme zeigt rechts eine normale Nierenkontur und ein normal konfiguriertes Nierenbecken, wo der Abgang des Ureters deutlich festzustellen ist. Die linke Seite zeigt eine Reihe runder, haselnußgroßer Gebilde mit der Deutlichkeit, die einer Urofektanfüllung entspricht. Die zweite Aufnahme zeigt diese Verhältnisse noch deutlicher. Die Därme waren immer noch stark lufthaltig.

4. Januar 1932: Der Leib ist leicht aufgetrieben, aber sehr weich und gut zu palpieren, nirgendwo druckschmerzhaft. Der Tumor der linken Seite ist nicht mehr feststellbar. Die Milz ist nicht zu fühlen.

Am 7. Januar der gleiche Befund. Der Wasserkonzentrationsversuch ergibt bei genügender Ausscheidung eine verringerte Konzentrationsfähigkeit.

Am 16. Januar wird das Kind auf die chirurgische Abteilung verlegt und dort folgender Befund erhoben: Der Leib ist etwas aufgetrieben, normale Bauchatmung. Der Leib ist weich und gut eindrückbar, nirgends druckempfindlich, auch die Nierengegenden beider Seiten sind in keiner Weise druckschmerzhaft. Eine abnorme Resistenz besteht nicht, ein Tumor ist nicht palpabel. Milz und Leber sind nicht vergrößert. Das Kind ist allgemein blaß und schwächlich.

Vom 20. bis 27. Januar bestand ein scarlatiniförmiges Exanthem bei wenig gerötetem Rachen und normaler Temperatur. Trotz der wiederholten Untersuchungen des Abdomens konnte ein Tumor in der linken Nierengegend nicht festgestellt werden. Das gebesserte Allgemeinbefinden des Kindes läßt eine Operation zu.

Extirpation der linken Niere in Avertin — Rektalnarkose durch *Prof. Dr. Drachter*.

Linksseitiger Lumbalschnitt, schichtweises Vorgehen durch Faszie und Muskulatur. Das weit nach hinten reichende Peritoneum wird von der Umschlagsfalte nach vorn abgedrängt, und nun liegt die vergrößerte, bucklig vorgewölbte Niere, die sich als mäßig große Hydronephrose erweist, vor. Da von normalem Nierengewebe anscheinend nur wenig vorhanden ist, wird die Geschwulst ohne große Mühe stumpf ausgelöst und vor die Wunde luxiert. Das dem ziemlich schmalen Parenchymmantel anhängende, auf Kastaniengröße ausgedehnte Nierenbecken trägt an seinem unteren Pol den Ureter, der doppelt gefaßt,

durchtrennt und mit Catgut unterbunden wird. Ebenso werden die über die Mitte des Nierenbeckens verlaufenden ziemlich dicken Nierengefäße durchtrennt und in Toto mittels Seide ligiert. Eine Abknickung des Ureters ließ sich keineswegs feststellen. Primäre Etagnenah, Verband.

Das extirpierte Präparat zeigt als größte Länge 17 cm, als größte Breite 9 cm. Der Inhalt ist eine trübe Flüssigkeit.

Die aufgeschnittene Niere zeigt hochgradige Erweiterung der Hohlräume und weitgehende Abplattung des Parenchyms; Rinde und Mark sind stark geschwunden und entsprechend den ausgeweiteten Kelchhöhlen nach außen bucklig vorgewölbt. Am Grunde der napfförmig erweiterten Kelche, welche sich ganz breit in das ebenfalls stark ausgedehnte Nierenbecken öffnen, sieht man die Reste der plattgedrückten Marksubstanz. Die Wand des Nierenbeckens ist verdickt, fühlt sich derber an als sonst und zeigt eine unregelmäßig fleckig gerötete, hier und da auch etwas aufgerauhte Innenfläche. Etwa in der Mitte der unteren Zirkumferenz des aufgeschnittenen Nierenbeckens geht der Ureter ab, der keine Besonderheiten zeigt.

Der postoperative Verlauf ist kompliziert durch eine wohl vom Ureterstumpf ausgehende geringgradige Infektion der Wundhöhle, sowie späterhin durch eine linksseitige Pneumonie.

Das Kind konnte am 31. März 1932 geheilt entlassen werden.

Die bei den Operationen vorgefundenen Verhältnisse ergaben in beiden Fällen eine normale anatomische Lage der erkrankten Nierenorgane. Abgang, Verlauf und Beschaffenheit der Ureteren ließen keine Anomalien erkennen, aus denen die Herausbildung des hydronephrotischen Zustandes zu erklären gewesen wäre. An den Präparaten der herausgenommenen Nieren zeigt sich nur die Dilatation von Nierenbecken und Kelchen und das Schwinden der Marksubstanz, aber keinerlei Veränderungen — Verdickungen der Schleimhaut, Klappenbildung am Ureterabgang —, die ein Abflußhindernis bedeuten würden. Es handelt sich hier also um sicher schon längere Zeit bestehende, einseitige Hydronephrosen, für deren Entwicklung eine mechanische Abflußstörung nicht gefunden werden konnte.

Es soll zunächst auf die Entstehungsursachen der Hydronephrose eingegangen werden. Nach den heutigen Begriffen wird die Hydronephrose nicht mehr als Erkrankung sui generis aufgefaßt, wie wir dies noch bei Rokitsansky — unter dem Namen eines „Hydrops renalis“ — finden, sondern als das Endstadium eines pathologischen Prozesses, der in irgendeiner Behinderung der Harnentleerung besteht. Für eine solche Be-

hinderung sind einmal die mannigfaltigsten mechanischen Ursachen bekannt. Als solche sind zu nennen: alle angeborenen Mißbildungen der ableitenden Harnwege, die etwa in Klappenbildungen am Abgang des Ureters vom Nierenbecken bestehen können, oder in Klappenbildungen und Divertikeln im weiteren Verlaufe des Ureters — in anormalem Abgange des Ureters vom Nierenbecken (zu hoher oder spitzwinkliger Abgang) und ebenso anormale Einmündung in die Blase. Angeborene Ureterknickungen, und auch die Mißbildungen des letzten Abschnittes der ableitenden Harnwege — wie etwa eine angeborene Hypertrophie des Colliculum feminale, Faltenbildungen im Blasenhal, Urethraklappenbildungen und schließlich Phimosen — können die Ursachen zur Ausbildung einer Hydronephrose sein. Weiterhin gehören zu den angeborenen Ursachen auch Dysplasien und Mißbildungen der Niere selbst (Hufeisenniere z. B.) und Anomalien von Nachbarorganen. Sehr häufig ist eine Behinderung der Harnentleerung durch aberrante, überzählige Nierengefäße verursacht, die über das Nierenbecken oder den Anfangsteil des Ureters hinwegziehen und nach *Corning* als eine Entwicklungshemmung aufzufassen sind; sie kommen, allerdings ohne immer zu einer Stenosierung zu führen, in einem Drittel aller Fälle überhaupt vor.

Diesen angeborenen Ursachen gegenüber stehen dann die erworbenen Harnabflußbehinderungen mechanischer Art. Da kommen Steinbildungen sowohl in Nierenbecken und Ureteren als auch in der Blase und der Urethra in Frage, wenn sie lange in den Abflusswegen verharren und einen mehr oder weniger vollständigen Verschuß derselben bedingen. Wichtig sind hier vor allem auch die Strikturen, die nach entzündlichen Prozessen der abführenden Harnwege zurückbleiben (akute und chronische Entzündungen verschiedener Ätiologie — Nierentuberkulose usw.). Weiter ist an die Möglichkeit zu denken, daß auch Entzündungen an benachbarten Organen solche Störungen hervorrufen können — z. B. eine rechtsseitige Hydronephrose durch perityphlitische Verwachsungen bedingt sein kann. (Lit. unter 1, 4, 16, 17, 19.)

In den beiden hier vorliegenden Fällen handelt es sich aber — wie schon erwähnt wurde — um solche, bei denen keine der beschriebenen mechanischen Ursachen aufgefunden werden konnten, und schon frühzeitig haben *Israel* (1) und *Fedoroff* (2) darauf aufmerksam gemacht, daß dies für eine große Zahl der Hydronephrosen zutrifft. In Unterscheidung zu den aus einem mechanischen Hindernis entstandenen, hat man diese als Hydronephrosen aus dynamischen oder funktio-

nellen Ursachen bezeichnet. Man nahm an, daß es sich hierbei vielleicht um eine auf Innervationsstörungen beruhende Inkoordination im Ablauf der Ureterperistaltik handele, die einen unregelmäßigen Abfluß des Harns und somit eine Stauung im Nierenbecken zur Folge habe. Diese Annahme, die auf Grund zystoskopischer Beobachtungen an nervösen Personen gemacht wurde (1), hat jedoch zu wenig Beweiskraft, um für die Entwicklung einer Hydronephrose verantwortlich gemacht zu werden. Anders ist es bei der Annahme einer funktionellen Schwäche der ablaufenden Harnleiterbewegungen. In vielen Fällen findet man anatomisch vor allem eine schlaffe Erweiterung des Ureterrohres vor, die nicht von einem mechanischen Hindernis hervorgerufen ist. Wir haben dann das Bild der Ureteratonie, auf der sich konsekutiv die Hydronephrose entwickelt.

Aber in der Mehrzahl der Fälle findet man, wie auch in den vorliegenden, keine solchen Veränderungen an den Harnleitern. Man mußte also annehmen, daß dann — analog der Ureteratonie — auch die Möglichkeit einer funktionellen Schwäche des Nierenbeckens und der Kelche in Betracht käme.

Es sind somit folgende Fragen zu untersuchen:

1. Wie ist das Zustandekommen einer solchen Störung wie die der Ureteratonie erklärbar?

2. Können ähnliche Vorgänge, die sich primär in Nierenbecken und Kelchen abspielen, die Ursachen zur Entwicklung einer Hydronephrose sein?

Diese Fragen sind heute noch nicht vollständig zu beantworten, aber in der Literatur sind namentlich in den letzten Jahren Arbeiten erschienen, die über wertvolle Beobachtungen und Untersuchungen auf diesem Gebiet berichten.

Bei der Ureteratonie ist oft, statt eines mechanischen Abflußhindernisses, nur die mangelhafte oder fehlende Kontraktion der Uretermuskulatur als mutmaßliche Ursache zu finden, die eine regelmäßige, rhythmische Entleerung des Harns in die Blase unmöglich macht. Einerseits kommt hierfür eine Schädigung des Uretermuskelapparates in Frage. Diese kann angeboren oder erworben sein. *Bachrach* (3), *Blatt* (5) u. a. nehmen eine angeborene Insuffizienz des Uretermuskelapparates an; ebenso sieht auch *Gottlieb* (15) in einer Anzahl von Fällen die Ursache pathologischer Veränderungen und klinischer Erscheinungen in einer angeborenen Harnleiterdilatation. Bei solchen Fällen findet sich oft eine Häufung mit noch anderen Missbildungen des Urogenitalsystems. *Minder* (6) spricht von angeborener Insuffizienz der Muskulatur und von erworbener,

für welche letztere toxische, entzündliche und schließlich neurogene Einwirkungen verantwortlich gemacht werden. Andererseits sieht man die Ursache der verminderten Leistungsfähigkeit der Uretermuskulatur in einer Störung ihrer Innervation, wobei noch nicht zu erweisen ist, ob diese Störungen im zentralen oder vegetativen Nervensystem, den zuführenden Nerven oder schließlich in den nervösen Endapparaten der Ureterwand zu suchen sind. Niere, Nierenbecken und Ureter besitzen zentrípetale und zentrífugale Nervenbahnen, und die Beeinflussung der Uretertätigkeit durch das Großhirn ist experimentell sowohl als auch klinisch durch urologische Beobachtung nachgewiesen; jedoch kann es sich hierbei nur um kurzdauernde funktionelle Beeinflussung der Harnabscheidung handeln, in denen nicht Ursachen zur Entwicklung einer Hydronephrose erwiesen werden konnten.

Zur Untersuchung der Frage, ob eine Schädigung der nervösen Elemente der Ureterwand zur Atonie und daraus entstehender Hydronephrose führen könnte, stellte *Blatt* (5) Tierversuche an, indem er an den Uretern seiner Versuchstiere eine Sympathektomie ausführte. Er kam zu dem Ergebnis, daß dadurch tatsächlich in allen Fällen eine Veränderung erreicht wurde im Sinne einer Erweiterung proximal der geschädigten Stelle bis zum Nierenbecken und der entsprechenden Niere. *Blatt* nimmt daher auch an, daß all die anderen Schädigungen der Ureterwand, wie durch entzündlich-infiltrative Prozesse, toxische Lähmung, Elastizitätsschädigung, letzten Endes auf einer Schädigung der in der Ureterwand befindlichen Nervenelemente beruhen, und dadurch die Dysfunktion und Dilatation des Ureters bedingt wird.

Ähnlich wie *Blatt* stellte auch *Minder* (6) Tierversuche mit Kaninchen und Hunden an, erzielte aber bei seiner Methode vielfach starke Verwachsungen und Schwartenbildungen des künstlich geschädigten Ureters, die störend wirkten, weil dadurch schon hydronephrotische Veränderungen entstehen konnten. Er kommt aus dem Vergleich aller seiner Versuche zu der Auffassung, daß die primäre Veränderung der Ureterwand allein nicht so bedeutungsvoll sei, wenn nicht noch dazu ein mechanisches Hindernis bestehen würde. Auch zeigt sich dabei, daß eine Schädigung, die durch einen — hier künstlich hervorgerufenen — toxisch-entzündlichen Prozeß in der Ureterwand hervorgerufen ist, sowohl die Muskulatur wie die in ihr befindlichen Nervenend-Elemente in Mitleidenschaft zieht.

Diese Versuche bestätigen die klinischen Beobachtungen, nach denen überall da, wo eine Verletzung oder Entzündung

eintritt, oder wo sich Strikturen und Verwachsungen befinden, die Peristaltik des Ureters aufhört und sich oberhalb derselben eine Hydronephrose ausbildet. Sie erweisen eine Ätiologie der erworbenen Atonie und Harnleiter-Dilatation in Gegenüberstellung zu einer angeborenen Dilatation, bei der von vornherein die ungenügende austreibende Kraft des Ureters bei fehlendem mechanischen Abflußhindernis als Ursache angesehen wird.

Wie ist es nun bei denjenigen Fällen, wo die hydronephrotischen Veränderungen nur auf die Niere und das Nierenbecken beschränkt sind, und keine Erweiterung oder andere Veränderung des Harnleiters vorliegt?

Für diese Fälle galt die bereits erwähnte Annahme einer auf nervöser Basis beruhenden Inkoordination der Ureterperistaltik (1), die zu einer Harnstauung im Nierenbecken führen sollte, der Ureter selbst aber anatomisch unverändert bliebe. Da aber die funktionell-dynamischen Hydronephrosen durchaus nicht nur bei solchen nervösen Individuen gefunden werden, auf die sich die Beobachtungen in dieser Richtung beziehen, kann einer solchen Ätiologie keine große Wahrscheinlichkeit beigemessen werden. Dagegen macht *Israel* (1) darauf aufmerksam, daß bei Wanderniere infolge der Bewegung der Niere es zu einer Zerstörung des die Nerven enthaltenden Stieles kommen könne, die zu einer störenden reflektorischen Beeinflussung der Ureterperistaltik in diesem Sinne führen kann. Er erwähnt auch die Möglichkeit eines reflektorisch-spastischen Verschlusses dabei am Abgange des Ureters vom Nierenbecken.

Als nächste mögliche Entstehungsoberfläche erwähnt *Israel* (1) eine Schwäche der Austreibungskraft des Nierenbeckens, wobei er anführt, daß eine primäre Aplasie der Muskulatur des Nierenbeckens so selten sei, daß sie nicht für die Entstehung der meisten Hyponephrosen in Frage kommen könne; wahrscheinlicher ist daher eine innervatorische Störung anzunehmen. Es sind verschiedentlich Beobachtungen über die Kontraktionsfähigkeit des Nierenbeckens gemacht und beschrieben worden. Die erste machte *I. Israel* (7) an einer extirpierten Niere, an der er durch Berühren der Kelchschleimhaut fortschreitende Kontraktionen hervorrufen konnte. *Wassink* (8) hat dann später auch an einer operativ entfernten, hydronephrotischen Niere beobachten können, wie peristaltische Bewegungen von den Kelchen ausgingen und diese dann reaktive des Beckens hervorriefen. Wichtig ist vor allem, daß Nierenbecken und Ureter jedes eine funktionelle Einheit für sich bilden. So führt *Israel* an: daß *Pannet* (9) experimentell fand, wie auf zwei

Kontraktionen des Ureters eine des Beckens erfolge. Und ebenso weist *Israel* auf die Beobachtung am Tierexperiment hin und auf die klinische Beobachtung eines Hydroureters durch *Caulks*, die einen Muskelabschluß an der Ureterbeckengrenze erweisen.

Daraus ergibt sich, daß dem Nierenbecken eine selbständige Funktion für die Austreibung des Harns zukommt — daß der Mangel dieser Funktion Ursache einer Harnretention sein kann. Weitere klinische Beobachtungen haben das bestätigt und haben gezeigt, daß diese Beckenfunktion eine wesentliche Rolle spielt. *Minder* (6) macht darauf aufmerksam, daß durch die Pyelographie Hydronephrosen beobachtet werden, bei denen ein durchgängiger, in keiner Weise verengter Ureter gefunden wird, wo sich also eine gestörte Funktion nur im Bereich der Niere und des Nierenbeckens findet, während andererseits geknickte, dystopische Nieren beobachtet werden können, bei denen eine ausgesprochene Ureterknickung eine erschwerte Entleerung bedingt und es doch zu keiner Entwicklung einer hydronephrotischen Niere gekommen ist. So beschreibt auch *Pliverić* (10) einen Fall einer intermittierenden Hydronephrose, bei der er einen spitzwinkligen Ureterabgang am oberen Teile des Nierenbeckens fand. Nierenbecken und Kelche besaßen aber noch ihre Elastizität und Kontraktilität, so daß bei zeitweiliger Lösung des Verschlusses die Flüssigkeitsmenge noch bis zum Tage vor der Operation aus dem Nierenbecken ausgetrieben wurde. Auch die französische Schule — von *Leguen* ausgehend (11) — stellte fest, daß nicht erweiterte Nierenbecken vorkommen, bei denen aber trotzdem schon der Mechanismus der Entleerung gestört ist, und bezeichnet die Becken, bei denen die Entleerung langsamer als normal erfolgt, als „atonische Becken“, in denen das primäre Stadium der meisten hydronephrotischen Veränderungen von dieser Schule gesehen wird.

Anatomisch sind sowohl Muskelemente wie Nervenelemente gefunden worden, die für die peristaltischen Bewegungen der Kelche und des Nierenbeckens in Frage kommen. Durch eingehende Untersuchungen konnte *Haebler* (12) die auch schon von *Henle* und *Disse* beschriebenen Muskelemente in der Nierenkelchwand nachweisen. Er fand beim Menschen in der Kelchwand, an der Umschlagstelle auf die Papille, Längs- und Ringmuskelfasern und weiter oben an der Papillenbasis einen Ringmuskel. Am Tierexperiment beobachtete er bei Reizung zirkuläre Kontraktionen der Kelchschleimhaut, er fand aber beim Tier nur ein Flechtwerk von Ring-, Längs- und Schrägfasern. *Haebler* kommt in weiteren Untersuchungen (13)

zu dem Ergebnis, daß die Nierenkelche reichhaltig mit marklosen, vegetativen Nervenfasern versorgt sind. Er fand also ein gut entwickeltes neuro-muskuläres System in den Nierenkelchen vor, aus dem sich die Eigenbewegungen erklären lassen. In Analogie zu dieser reichen nervösen Versorgung der Kelche nimmt er ähnliche Verhältnisse für das Nierenbecken an und spricht die Vermutung aus, daß da möglicherweise auch Ganglienzellen sein könnten. Die Kontraktionsfähigkeit des Nierenbeckens untersuchte *A. Israel* (14) am Tierexperiment und fand bei seiner Methode nach elektrischer Reizung deutliche, myographisch feststellbare Ausschläge, die aber schwächer waren, als die Höhe der Ausschläge, die er bei gleichstarker Reizung am Ureter erzielen konnte.

Aus diesen Beobachtungen erscheint es also möglich, daß die gestörte Funktion von Nierenbecken und -kelchen zur Hydronephrose führen kann. Will man eine fehlerhafte Innervation hierfür verantwortlich machen, so müßte man annehmen, was auch *Haebler* (13) vermutet, daß es sich dann um eine Erkrankung des den Nervenfasern von Nierenbecken und -kelchen übergeordneten nervösen Zentrums handelt. Eine Automatie der Nierenbecken- und Ureterperistaltik ist nicht bekannt. Alle Untersuchungen über die Innervation haben bisher das Fehlen von Ganglienzellen sowohl in den Kelchen und der Nierenbeckenwand wie auch in der Ureterwand ergeben, mit Ausnahme nur des allerletzten distalen Teiles des Ureters unmittelbar an der Blase (*Israel* 1, Blatt 5). *Albrecht* (18) vermutet, daß etwa Störungen im Gebiete des Nervus Splanchnicus zu einer Hydronephrose führen könnten, und bemerkt hierbei, daß die austreibenden Kräfte des Nierenbeckens und Ureters ohnehin, im Gegensatz zu anderen Organen, nur gering sind und sich daher leichter erschöpfen könnten.

Für die Ätiologie der beiden hier besprochenen Fälle ließen sich keine Ursachen mechanischer Art auffinden, sie gehören zu den Hydronephrosen aus funktionell-dynamischer Ursache. Auch bei diesen ist, wie aus dem Vorangefagten hervorgeht, zwischen angeborenen und erworbenen zu unterscheiden. Für die erworbenen Schädigungen kommen toxische Einflüsse oder Entzündungsvorgänge in Frage. In den anderen Fällen, wo keine Anhaltspunkte für eine solche Ätiologie bestehen, bleibt die Annahme einer angeborenen Insuffizienz. Nach den Befunden bei den vorliegenden Fällen, die nur eine Erweiterung der Nierenkelche und des Beckens ergaben, aber keine Anhaltspunkte für eine Entzündung oder sonstige Schädigung, möchte ich sie zu den angeborenen funktionell-dynamischen

Hydronephrosen zählen, was noch durch das jugendliche Alter der Patienten und das anamnestische Bild Wahrscheinlichkeit erhält. Beim Kinde sind es meistens Hydronephrosen aus angeborenen Ursachen — sowohl mechanischer wie funktioneller Art (4), und wenn nicht nur auf das Kindesalter bezogen, sind es ein Drittel aller Fälle, die aus angeborenen Ursachen entstammen. Allerdings sind die angeborenen Hydronephrosen meistens doppelseitig, während hier nur einseitige nachgewiesen werden konnten und die Pyelographie bei beiden Fällen auf der anderen Seite normale Verhältnisse aufzeigte. Besonders hervorzuheben ist noch einmal, daß die Ureteren in beiden Fällen völlig normal gefunden wurden, kein Hindernis und keine Erweiterung aufwiesen, der hydronephrotische Zustand also nur auf Nierenbecken und Kelche ausgedehnt war, und deren ungenügende Funktion als Ursache der Erkrankung angenommen werden kann.

Zusammenfassung:

Es wurden zwei Fälle von Hydronephrosen bei Kindern beschrieben und deren Entstehungsursachen untersucht.

Dabei wurde unterschieden zwischen:

1. Hydronephrosen aus mechanischer Ursache
 - a) angeborene,
 - b) erworbene.
2. Hydronephrosen aus funktionell-dynamischer Ursache
 - a) angeborene,
 - b) erworbene.

Bericht und Beschreibung der Präparate erwiesen zwei Nieren, bei denen nur Nierenbecken und Kelche hydronephrotisch verändert waren, und bei denen keine mechanischen, anatomischen Hindernisse als Entstehungsursache dieser Veränderungen gefunden wurden. Es wurde untersucht, welche Störungen im Ablauf der Funktion von Nierenbecken und Harnleitern zur Entstehung der dynamischen Hydronephrose führen. Einerseits wurden angeborene Schädigungen sowohl der Nerven- wie der Muskelelemente angenommen — andererseits erworbene Schädigung durch Verletzung oder Entzündung, für welche auch der experimentelle Nachweis am Tierversuch angeführt werden konnte.

Eine solche funktionelle Störung kann auch das Nierenbecken allein treffen, da Nierenkelche und Nierenbecken, wie aus den angeführten Beobachtungen hervorgeht, eigene Kontraktionen und einen selbständigen Ablauf der Bewegungen

gegenüber denen des Ureters zeigen, und in ihnen Nerven- und Muskelemente nachgewiesen sind.

Da in den beschriebenen Fällen keine erworbene Schädigung durch entzündliche Prozesse festzustellen war, und die Ausbildung der Hydronephrose bei den beiden noch sehr jugendlichen Patienten schon sehr fortgeschritten war, konnten sie zu den angeborenen, funktionell-dynamischen Hydronephrosen gezählt werden.

Literatur-Verzeichnis.

1. *Israel*: Chirurgie der Niere und des Harnleiters.
2. *Fedoroff* zitiert nach *Israel* (1) und *Blatt* (5).
3. *Bachrach*: Über atonische Dilatation des Nierenbeckens und des Harnleiters. *Bruns Beitr. z. Klin. Chir.* 88, 2.
4. Handbuch für Kinderheilkunde 1931 — 4. Band.
5. *P. Blatt*: Erzeugung von dynamisch-funktionell bedingten Hydronephrosen durch Sympathektomie am Ureter. *Zeitschrift f. Urolog. Chir.* 25.
6. *J. Minder*: Über Hydronephrosen auf Grund klinischer und experimenteller Erfahrungen. *Zeitschrift f. Urolog. Chir.* 31.
7. Zitiert nach *I. Israel* (1) und *A. Israel* (14).
8. Zitiert nach *I. Israel* (1) und *Haebler* (12).
9. Zitiert nach *Israel* (1).
10. *Plivieric*: Seltener röntgenologischer Befund einer akuten intermittierenden Hydronephrose usw. *Zeitschr. f. Urolog. Chir.* 30.
11. Zitiert nach *Minder* (6).
12. *H. Haebler*: Zur Funktion der Nierenkelche.
13. *H. Haebler*: Über die nervöse Verforgung der Nierenkelche. *Zeitschr. f. Urolog.* 16, 4, und 16, 9.
14. *A. Israel*: Physiologische Versuche über die Kontraktilität des Nierenbeckens und des Harnleiters. *Zeitschr. f. Urolog. Chir.* 12.
15. *J. Gottlieb*: Angeborene Nieren- und Harnleiteranomalien. *Zeitschr. f. Urolog. Chir.* 26.
16. *C. H. Ludowigs*: Hydronephrose mit Ureterkompression durch aberrante Gefäße. *Zeitschr. f. Urolog. Chir.* 12.
17. *W. Tinnemeyer*: Über Hydronephrose aus Entwicklungsstörungen und über Enge im Ureterverlauf. *Zeitschr. für Urolog. Chir.* 12.
18. *Albrecht* zitiert nach *Israel* (1).
19. *Gg. B. Gruber*: Über Mißbildung der Niere und Harnleiter. *Zeitschr. f. Urolog. Chir.* 26.